Применение Ронколейкина в комплексном лечении панкреонекроза на примере клинического случая

Стяжкина Светлана Николаевна профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 426034, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281, e-mail: asu@rkb1.udm.ru;
Чернышова Татьяна Евгеньевна профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 426034, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281
Неганова Ольга Андреевна главный врач БУЗ УР ГКБ № 9 МЗ УР
Русских Юлия Станиславовна e-mail: Russkix-yulya@mail.ru
Газимзянова Рания Фархадовна e-mail: garaniya1999@gmail.com
Для корреспонденции:
С. Н. Стяжкина https://orcid.org/0000-0003-4159-2674
Т. Е. Чернышова https://orcid.org/0000-0003-4268-145X
О. А. Неганова https://orcid.org/0000-0001-5438-3551
Ю. С. Русских https://orcid.org/0000-0002-8670-0459
Р. Ф. Газимзянова https://orcid.org/0000-0002-5845-1432

Ключевые слова: панкреонекроз, рекомбинантный интерлейкин-2
Журнал: Терапевт №5 2020, №5, 2020

На сегодняшний день проблема панкреонекроза остается на лидирующих позициях в ургентной хирургии. Ежегодно увеличивается заболеваемость этой патологией. В данной статье представлены результаты анализа использования препарата «Ронколейкин» в клинической практике при панкреонекрозе. Исследование проводилось с целью оценки эффективности данного препарата в комплексном лечении панкреонекроза. Применение рекомбинантного интерлейкина 2 при этом заболевании позволяет избежать последующих гнойных осложнений панкреонекроза, поднять общую сопротивляемость организма к инфекциям и скорректировать иммунный статус.

UDK: 616.21-022.7-036.11-053.2+615.373 DOI:10.33920/MED-12-2005-07

Use of Roncoleukin in the complex treatment of pancreatic necrosis on the example of a clinical case

Svetlana Styazhkina — Doctor of Medicine Professor, Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation; ul. Kommunarov, 281, Izhevsk, Udmurt Republic, 426034, Russian Federation; asu@rkb1.udm.ru
Tatyana Chernyshova — Doctor of Medicine Professor, Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation; ul. Kommunarov, 281, Izhevsk, Udmurt Republic, 426034, Russian Federation
Olga Neganova — General practitioner Chief physician of City Clinical Hospital No. 9 of the Udmurt Republic, Ministry of Health of the Russian Federation
Yuliya Russkikh — student Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation; Russkix-yulya@mail.ru
Raniya Gazimzyanova — student Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation; garaniya1999@gmail.com
For correspondence:
S. N. Stjazhkina https://orcid.org/0000-0003-4159-2674
T. E. Chernyshova https://orcid.org/0000-0003-4268-145X
O. A. Neganova https://orcid.org/0000-0001-5438-3551
R. F. Gazimzyanova https://orcid.org/0000-0002-8670-0459
Ul. S. Russkikh https://orcid.org/0000-0002-5845-1432

Keywords: pancreatonecrosis, roncoleukin-2
Journal: Терапевт №5 2020, №5, 2020

Today, the problem of pancreonecrosis remains in the leading positions in urgent surgery. The incidence of this pathology increases every year. This article presents the results of the analysis of the use of the drug "Roncoleukin" in clinical practice for pancreonecrosis. The study was conducted to evaluate the effectiveness of this drug.

Проблема панкреонекроза остается одной из самых актуальных в настоящее время, разрабатываются новые методы лечения и хирургической коррекции для снижения процента

летальности. Панкреонекрозом страдают 20–25 % больных, поступивших в стационар с диагнозом «острый панкреатит» [1]. Общая летальность от острого панкреатита в мире составляет от 5 до 10 %, однако далеко не все отечественные клиники могут похвастаться таким «мировым уровнем» (5). Показатели летальности, по данным различных авторов, в России могут достигать до 85 %. В структуре смертности в УР занимает 4-е место — 9,6 % [4].

Панкреонекроз — деструктивное заболевание поджелудочной железы, являющееся осложнением острого панкреатита и приводящее к развитию полиорганной недостаточности.

Причиной, приводящей к развитию острого панкреатита, трансформирующегося в панкреонекроз, является злоупотребление алкоголем, жареной, острой пищей. Одна из причин — желчнокаменная болезнь, приводящая к развитию билиопанкреатического рефлюкса в результате разницы давления в общем желчном и панкреатическом протоках. Кроме того, причинами, приводящими к развитию панкреонекроза, могут быть ятрогении при выполнении операций на желчевыводящих путях, поджелудочной железе. К редким причинам относятся заболевания печени вирусной этиологии, тяжелая пищевая аллергия, сосудистые патологии, приводящие к ишемии железы, химиотерапия.

Фактор риска — злоупотребление жирной и острой пищей. Отмечается определенная сезонность заболеваемости: наибольшее поступление больных — в зимние месяцы и значительное снижение заболеваемости, особенно деструктивными формами, в летний период, что связано прежде всего с изменением характера питания — увеличением летом употребления свежих овощей, фруктов и уменьшением в рационе мясной и жирной пищи [3].

В современной классификации выделяют панкреонекроз:

1) по распространенности патологического процесса: мелко-, средне-, крупноочаговый, субтотальный; тотальный;

2) по зоне поражения поджелудочной железы: ограниченный панкреонекроз (в паренхиме поджелудочной железы имеются мелкие или среднего размера очаги некротического процесса); распространенный панкреонекроз (тотальный или субтотальный некроз);

Для Цитирования:
Стяжкина Светлана Николаевна — доктор медицинских наук, Чернышова Татьяна Евгеньевна — доктор медицинских наук, Неганова Ольга Андреевна — врач-терапевт, Русских Юлия Станиславовна — студентка ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Газимзянова Рания Фархадовна — студентка ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Для корреспонденции:, С. Н. Стяжкина, Т. Е. Чернышова, О. А. Неганова, Ю. С. Русских, Р. Ф. Газимзянова, Применение Ронколейкина в комплексном лечении панкреонекроза на примере клинического случая. Терапевт №5 2020. 2020;5.